

# IMPÉTIGO



Staphylocoque doré, streptocoque A



**INCUBATION:** 1 à 10 jours



Saison chaude et humide (été)



Période néonatale,  
Âges préscolaire et scolaire



**CONTAGIOSITÉ:** contamination par contacts avec les lésions



**ÉVICTION SCOLAIRE** pendant les 2 premiers jours du traitement



- Bon état général
- Pas de fièvre
- Pas ou peu de prurit



Conjonctives normales



**SIGNE PARTICULIER.** Auto-inoculation rapide, lésions en miroir



**NE PAS CONFONDRE AVEC :** varicelle, zona, herpes simplex, piqûres d'insecte, dermatite à rhus, mycose



**ÉVOLUTION.** Guérison rapide sous traitement antibiotique

**COMPLICATIONS (inhabituelles):** cellulite, lymphangite, arthrite, septicémie, glomérulonéphrite

**FACTEURS DE RISQUE :** période néonatale, déficits immunitaires, promiscuité

**RISQUE EMBRYO-FOETAL** négligeable

## ÉRUPTION VÉSICULO-BULLEUSE ET CROÛTEUSE

- Lésions vésiculo-bulleuses à contenu clair ou trouble de différentes tailles, à parois flasques et fragiles.
- Placards rouge vif, suintants et croûteux.
- Sites de prédilection: visage, aisselles, abdomen, siège.
- Élargissement et multiplication rapide des lésions.
- Parfois hyperpigmentation cicatricielle.
- Pas de lésions muqueuses.



**TRAITEMENT** antibiothérapie orale de préférence à antibiothérapie topique



**PRÉVENTION.** Soins d'hygiène rigoureux

Partager cette image  
Code HTML - Pour sites et blogs

`<a href="http://nounoudunord.centerblog.net"><img src="http`

`BBCode IMG - Pour les forums`

`[url="http://nounoudunord.centerblog.net"][img]http://nounou`

