

MALADIE "MAINS-PIEDS-BOUCHE"



Virus coxsackie A 16



INCUBATION: 3 à 6 jours



Printemps et été



Âges préscolaire et scolaire



CONTAGIOSITÉ: pendant les 7 jours suivant le début du rash



ÉVICTION SCOLAIRE au besoin (selon état clinique)



- Bon état général
- Pas ou peu de fièvre
- Dysphagie, anorexie



Conjonctives normales



SIGNE PARTICULIER. Distribution des lésions



NE PAS CONFONDRE AVEC : varicelle, stomatite herpétique, herpès



ÉVOLUTION. Guérison spontanée en près d'une semaine

COMPLICATIONS inhabituelles: déshydratation, myocardite, méningo-encéphalite

FACTEURS DE RISQUE : absence apparente

RISQUE EMBRYO-FOETAL négligeable



ÉRUPTION VÉSICULEUSE

- Vésicules à contenu clair ou citrin cernées d'un liseré rouge ou maculo-papules situées au niveau des mains et des pieds
- Lésions maculo-papuleuses au niveau des fesses et sur le haut des cuisses
- Parfois éléments papulo-vésiculeux au niveau du tronc et des membres
- Chez la fille, présence possible de lésions vésiculeuses au niveau des régions inguinales et vulvo-périnéale
- Lésions aphteuses au niveau des muqueuses buccales et sur les lèvres
- Pas d'atteinte des muqueuses conjonctivales



TRAITEMENT symptomatique



PRÉVENTION. Informer et rassurer
Conseils d'hygiène