

# MALADIE DE GIANOTTI-CROSTI



Virus Epstein-Barr et autres virus



**INCUBATION:** durée variable selon étiologie



Toutes saisons



Âge préscolaire



**CONTAGIOSITÉ:**  
habituellement peu contagieux



**ÉVICTION SCOLAIRE** indiquée ou non selon contexte clinique



Généralement

- Bon état général
- Pas ou peu de fièvre
- Pas ou peu de prurit



Conjonctives normales



**SIGNE PARTICULIER.** Distribution des lésions (joues, coudes et genoux)



**NE PAS CONFONDRE AVEC :** varicelle, urticaire, rash à l'amoxicilline, dermatite de contact, eczéma, gale



**ÉVOLUTION.** Guérison spontanée en 2 à 4 semaines

**COMPLICATIONS:** maladie bénigne sous sa forme commune de cause indéterminée

**FACTEURS DE RISQUE :** dépendant de l'agent causal

**RISQUE EMBRYO-FOETAL** négligeable

## ÉRUPTION PAPULEUSE

- Papules rosées ou rouges, parfois purpuriques, de petites tailles, situées classiquement sur les joues, les coudes et les genoux
- Parfois, larges placards rouges et surélevés par confluence des lésions
- Chez l'enfant, éruption souvent généralisée avec lésions clairsemées sur le tronc et les membres (syndrome de Gianotti-Crosti)
- Guérison sans cicatrices
- Pas de lésions muqueuses



**TRAITEMENT** symptomatique

**PRÉVENTION.**  
Informer et rassurer

