

La Roséole



Virus herpétique humain type 6 ou 7



INCUBATION : 5 à 15 jours



Toutes saisons



Surtout entre 6 et 24 mois



Contagiosité : pendant la phase fébrile



EVICION SCOLAIRE
surveillance à domicile de l'enfant fébrile



- Etat général plutôt bon
- Forte fièvre
- Irritabilité
- Tympan congestifs



Conjonctives normales



SIGNE PARTICULIER. Fièvre de 3 jours puis éruption



NE PAS CONFONDRE AVEC :
autre exanthème virale (entérovirus, rubéole, rougeole) rash allergique.



ÉVOLUTION. Guérison habituelle complète en moins d'une semaine



COMPLICATIONS : convulsion fébrile, hypertension intracrânienne bénigne, méningo-encéphalite.



FACTEURS DE RISQUE : Transplantation, déficit immunitaire.



RISQUE EMBRYO-FŒTAL. Négligeable.



ÉRUPTION MACULO-PAPULEUSE



- Maculo-papules rosées se localisant préférentiellement au niveau du tronc (abdomen et région lombaire) et du visage (front).
- Éruption apparaissant dans les 24 à 48 h qui suivent le retour de la température à la normale et disparaissant en moins de 3 jours, sans desquamation, ni pigmentation.
- Parfois présence de petites lésions maculo-papuleuses au niveau du palais mou (taches de Nagayama).



TRAITEMENT. symptomatique.



PRÉVENTION :
Soins d'hygiène habituels