

# RUBÉOLE



Virus de la rubéole



**INCUBATION:** 14 à 21 jours



Hiver, printemps



Surtout nourrissons et adolescents



**CONTAGIOSITÉ:** les 7 jours avant et après le début de l'éruption (Pendant plusieurs mois pour la rubéole congénitale)



**ÉVICTION SCOLAIRE** 1 semaine (période contagieuse)



- Bon état général
- Pas ou peu de fièvre
- Adénopathies sous-occipitales et rétro-auriculaires
- Arthralgies distales (adolescents, adultes)



Conjonctives normales



**SIGNE PARTICULIER.** Risque tératogène



**NE PAS CONFONDRE AVEC :** autre exanthème viral, scarlatine, allergie



**ÉVOLUTION.** Guérison rapide de la forme acquise


**COMPLICATIONS inhabituelles:** encéphalite, purpura, anémie hémolytique, myocardite, péricardite

**FACTEURS DE RISQUE :** grossesse

**RISQUE EMBRYO-FŒTAL.** Risque d'embryopathie-foetopathie tératogène

## ÉRUPTION MACULO-PAPULEUSE

- Éruption non prurigineuse du visage puis du tronc et des membres
- Macules rouges ou rosées, espacées de peau saine, plus vives et plus denses sur les joues, plus clairsemées sur le tronc et les membres
- Pas d'atteinte des muqueuses



**TRAITEMENT** symptomatique



**PRÉVENTION.**

*Contacts normaux :* surveillance  
*Femmes enceintes :* vérification du statut sérologique, gammaglobulines IM (?)

Partager cette image

Code HTML - Pour sites et blogs

`<a href="http://nounoubretignysurorge.centerblog.net"><img`

BBCode IMG - Pour les forums

`[url="http://nounoubretignysurorge.centerblog.net"]http://`

