

# VARICELLE



Virus varicelle-zona



**INCUBATION:** ± 15 jours. Après immunoglobulines: jusqu'à 20 jours



Toutes saisons



Surtout âge scolaire



**CONTAGIOSITÉ:** 5 jours avant l'éruption et jusqu'à l'assèchement des lésions



**ÉVICTION SCOLAIRE** indiquée ou non selon contexte clinique



- État général plutôt bon
- Fièvre modérée
- Prurit cutané



Conjonctives normales



**SIGNE PARTICULIER.** Vésicules et prurit



**NE PAS CONFONDRE AVEC :** piqûres d'insecte, maladie de Gianotti-Crosti, molluscum contagiosum, herpès cutané, folliculite, maladie mains-pieds-bouche



**ÉVOLUTION.** Guérison habituelle en ± 1 semaine



**COMPLICATIONS:** impétigo, cellulite, fasciite, pneumonie, hépatite ataxie, encéphalite, syndrome de Reye



**FACTEURS DE RISQUE :** période néonatale, prématurité, âge adulte, déficits immunitaires, aspirine



**RISQUE EMBRYO-FOËTAL.** Faible risque d'embryopathie



## ÉRUPTION VÉSICULEUSE

- Rash photosensible généralisé à prédominance tronculaire.
- Lésions maculo-papuleuses puis vésiculeuses et croûteuses.
- Éléments d'âge et d'aspect différents dans un même territoire
- Cicatrices hypopigmentées ou hyperpigmentées
- Vésicules ou lésions érosives sur les muqueuses buccale et génitale



**TRAITEMENT** symptomatique; acyclovir si facteur de risque



## PRÉVENTION.

Contacts normaux : surveillance  
Contacts à risque: immunoglobulines de varicelle-zona (VariZIG)



Partager cette image

Code HTML - Pour sites et blogs

`<a href="http://nounoudunord.centerblog.net"><img src="http`

`BBCode IMG - Pour les forums`

`[url="http://nounoudunord.centerblog.net"][img]http://nounou`



XiTi

XiTi

XiTi